

# octenisept® + Vaginal Applikator

Ein starkes Team  
bei Scheideninfektionen.

Breite Wirkung.  
Einzigartige Anwendung.

- ✓ farblos
- ✓ einfach
- ✓ diskret




## Wenn es juckt und brennt.



Die natürliche Vaginalflora der gesunden Frau besteht aus einer Vielzahl unterschiedlicher Bakterienstämme und ist ein wichtiges Schutzschild vor unangenehmen Infektionen. Speziell Laktobazillen sorgen für ein leicht saures Milieu in der Scheide, in dem sich krankmachende Keime nur schwer vermehren können.

Stress, Antibiotika, ein geschwächtes Immunsystem oder hormonelle Veränderungen können die Balance des natürlichen Scheidenmilieus jedoch leicht zum Kippen bringen. Es können Infektionen entstehen, die vorrangig durch Bakterien und Pilze verursacht werden.

Die **klinischen Symptome** sind dabei vielseitig (z. B. Rötung, Brennen, Juckreiz, vermehrter Ausfluss, unangenehmer Geruch) und können je nach Erreger sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. **Häufig handelt es sich dabei auch um Mischinfektionen.** Diese werden in der Regel durch den gleichzeitigen Einsatz von Antibiotika (gegen Bakterien) und Antimykotika (gegen Pilze) behandelt, wobei die zunehmende Resistenzentwicklung der beteiligten Erreger eine Therapie nochmals deutlich erschwert.



## Eigenschaften und Vorteile.

- Wirksam gegen ein **breites Erregerspektrum** (Bakterien und Pilze).<sup>1-3</sup>
- Klinische Studien zeigen **eine gute Verträglichkeit bei nicht schwangeren und schwangeren Frauen.**<sup>1-5</sup>
- Einfache und diskrete Handhabung** durch den eigens entwickelten Vaginal Applikator.
- Lokale Wirksamkeit** und dadurch schonend für den Körper.
- Farblos** und **keine unangenehmen Flecken** in der Wäsche.
- Auch zur **Partnerbehandlung** geeignet.

✓ **Breite Wirkung.**  
Reduziert lästige Erreger (Bakterien und Pilze).


✓ **Einzigartige Anwendung.**  
Mit dem besonderen Vaginal Applikator: Für eine einfache und diskrete Anwendung.



<sup>1</sup> Novakov Mikić & Stojic, 2015; <sup>2</sup> Novakov Mikić & Budakov, 2010; <sup>3</sup> Friese et al., 2003; <sup>4</sup> Briese et al., 2010; <sup>5</sup> Friese et al., 2000

## Die richtige Anwendung.

### octenisept® + Vaginal Applikator



**Tipp**  
Dieser QR Code führt Sie zu einem Video über die richtige Anwendung und empfohlene Dosierung von octenisept® + Vaginal Applikator.

## Für einen guten Erfolg!

Dank des eigens entwickelten Applikators kann octenisept® einfach und diskret angewendet werden und die Scheidenwand optimal benetzen:



- 1** durchsichtige Schutzkappe und Sprühkopf von der 50ml octenisept® Flasche entfernen, stattdessen den Applikator aufsetzen
- 2** vor der Anwendung mehrere Pumphübe durchführen bis die Flüssigkeit aus dem Applikator tritt – das Sprühen kann aus jedem Winkel erfolgen
- 3** den Applikator auf der Toilette sitzend oder im Bett liegend tief in die Scheide einführen
- 4** nach der Anwendung den Applikator nach unten gerichtet noch einmal aussprühen, unter fließendem Wasser abspülen, mit einem sauberen Tuch abtrocknen und bis zum nächsten Tag stehen lassen.

Soweit nicht anders verordnet, gelten folgende Dosierungsrichtlinien: Beginnen Sie Ihre Behandlung am ersten Tag mit je einer Anwendung (10 Pumphübe, ca. 1,7 ml) morgens und abends. In den darauffolgenden sechs Tagen ist eine einmalige abendliche Anwendung ausreichend.

Nach Abschluss des mehrtägigen Behandlungszyklus ist der Applikator aus hygienischen Gründen zu entsorgen.

**Bitte wenden Sie octenisept® in Kombination mit dem Vaginal Applikator immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker an.**

## Schwangerschaft.



### Dürfen während der Schwangerschaft Beschwerden im Intimbereich behandelt werden?

Besonders während der Schwangerschaft ist die Vagina durch die hormonelle Veränderung der Frau besonders anfällig für Infektionen durch Bakterien und Pilze. Unbehandelt kann vor allem eine bakteriell bedingte vaginale Infektion Richtung Gebärmutter aufsteigen und schlimmstenfalls vorzeitige Wehen, einen zu frühen Blasensprung und so eine Frühgeburt oder Fehlgeburt verursachen.

**octenisept® ist auch in der Schwangerschaft anwendbar.<sup>1,4</sup>**

- aufgrund seiner Molekülstruktur gelangt der enthaltene Wirkstoff Octenidin weder durch die intakte Haut noch durch die Schleimhaut oder über die Wundoberfläche in den Körper
- octenisept® kann bei allen Patientinnen angewendet werden, inklusive Schwangeren und stillenden Müttern

**Es wird empfohlen, dass Sie bereits bei den ersten Anzeichen einer Infektion Ihren Arzt aufsuchen, um möglichst früh mit einer geeigneten Therapie zu beginnen.**


## Partnerbehandlung.



### Partnerbehandlung ist sinnvoll!

Der Partner kann Überträger von Keimen sein, ohne selbst Anzeichen einer Infektion zu zeigen. Um lästige „Ping-Pong-Effekte“ zu vermeiden, kann durch die einfache Mitbehandlung des Partners das Risiko einer erneuten Infektion verringert werden.

Sprühen Sie hierzu octenisept® mit aufgesetzter Sprühkappe auf das männliche Genital, bis dieses vollständig benetzt ist.



## octenisept® und Vaginal Applikator

Für eine Therapie vaginaler Infektionen sind sowohl das Arzneimittel octenisept® als auch der Vaginal Applikator erforderlich. Beide Produkte sind rezeptfrei in Ihrer Apotheke erhältlich.

Mit bester Empfehlung:

**PZN octenisept®: 1876970 | PZN Vaginal Applikator: 4733805**

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.

Für mehr Informationen besuchen Sie uns auf  
[www.octenisept.at](http://www.octenisept.at)

