

Chirurgiczna dezynfekcja rąk

Procedura chirurgicznej dezynfekcji rąk zgodnie z normą EN 12791

Mycie dłoni oraz przedramion (do łokci) delikatnym mydłem w płynie. Sterylne szczotki tylko do paznokci jeśli są niezbędne.



Osuszenie dłoni i przedramion jednorazowym ręcznikiem.



➔ Ręce muszą być umyte przed pierwszą operacją dnia oraz jeśli są widocznie zanieczyszczone.

Krok 1

Nanieść alkoholowy środek dezynfekcyjny na **suche ręce**. Dozowanie za pomocą **łokcia**.



Krok 3

Wcierać alkoholowy środek dezynfekcyjny w dłonie zgodnie z **techniką Ayliffe EN 1500**




Krok 2

Wcierać alkoholowy środek dezynfekcyjny w dłonie i przedramiona **przez min. 90 sek.**



Krok 4

Dłonie powinny być utrzymywane powyżej łokci w czasie oraz po zakończeniu wcierania środka. Ręce muszą być suche przed założeniem sterylnych rękawic.



Dłonie i przedramiona muszą być pokryte alkoholowym środkiem i wilgotne przez min. 90 sek.*

* osiągnięcie efektu zależy od czasu deklarowanego przez producenta środka