



gebrauchsfertiges Arzneimittel mit Octenidin zur Desinfektion in der Mundhöhle

octenimed® Gurgellösung

Unser Plus

- zur kurzzeitigen Desinfektion der Mundschleimhaut
- 2 bis 3-mal täglich mit ca. 20ml octenimed gurgeln oder spülen
- Anwendung während Schwangerschaft und Stillzeit möglich¹
- für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren
- einzige als Arzneimittel zugelassene Mundspüllösung mit Octenidin in der Schweiz²
- für Träger von Prothesen oder Implantaten geeignet

Anwendungsgebiete

octenimed® Gurgellösung wird zur kurzzeitigen Desinfektion der Mundschleimhaut angewandt.

Anwendungshinweise

Falls von der Ärztin/vom Arzt nicht anders verordnet, wenden Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren Octenimed Gurgellösung/Mundspülung 2 bis 3-mal täglich unverdünnt an. Füllen Sie dazu 10-20 ml Octenimed in den mitgelieferten Messbecher. Spülen Sie den Mund oder gurgeln Sie für mindestens 30 Sekunden mit jeweils 10-20 ml Octenimed. Wenn eine gute Wirksamkeit gegen Hefepilze (z.B. *Candida albicans*) erwünscht wird, wird empfohlen für eine Minute zu spülen oder zu gurgeln. Octenimed wird danach ausgespuckt. Octenimed sollte nicht verschluckt werden. Den Mund nicht unmittelbar nach der Anwendung mit Wasser ausspülen. Die Anwendung und Sicherheit von Octenimed bei Kindern unter 12 Jahren ist bisher nicht geprüft worden. Schwangerschaft/Stillzeit: Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemäßer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten oder mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.



octenimed[®] Gurgellösung

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 1,0 g/cm ³ / 20 °C
Farbe	fast farblos
Flammpunkt	Nicht anwendbar
Form	flüssig
pH	4 / 100 % / 20 °C
Viskosität, dynamisch	nicht bestimmt

Besondere Hinweise

Folgende Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Octenimed auftreten:

Geschmacksstörungen, Brennen und ein pelziges Gefühl im Mund und Rachen sowie einen bitteren Nachgeschmack können auftreten. Es kann zu Zahnverfärbungen kommen. In Einzelfällen können allergische Reaktionen auftreten.

Bei versehentlichem Schlucken von grösseren Mengen von Octenimed Gurgellösung/Mundspülung kann es zu einer Reizung der Magen-Darm-Schleimhaut kommen.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten oder mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
octenimed Gurgellösung 250 ml FL	12/Karton	70003646

Gutachten und Information

Eine vollständige Kopie der entsprechenden Referenzen können beim Unternehmen angefordert werden.

1 Es liegen keine systematischen Untersuchungen bei schwangeren Frauen vor. Das Präparat soll deshalb in der Schwangerschaft nur mit Vorsicht angewendet werden

2 www.swissmedinfo.ch



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Schweiz
Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstr. 58
8003 Zürich, Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com