



Médicament à l'octénidine prêt à l'emploi pour la désinfection de la cavité buccale

## octenimed® Solution pour gargarisme

### Notre plus

- pour la désinfection à court terme des muqueuses buccales
- gargariser ou rincer 2-3 fois par jour avec env. 20ml d'octenimed®
- aucune restriction pendant la grossesse et l'allaitement<sup>1</sup>
- pour les adultes et les adolescents à partir de 12 ans seule solution de rinçage buccal à l'octénidine homologuée en tant que médicament en Suisse<sup>2</sup>
- convient aux porteurs de prothèses ou implants orthodontiques

### Domaines d'utilisation

Octenimed Solution pour gargarisme est utilisée pour la désinfection à court terme de la muqueuse buccale.

### Conseils d'utilisation

Sauf prescription contraire de la/du médecin, les adultes et adolescents à partir de 12 ans doivent utiliser Octenimed Solution pour gargarisme/bain de bouche non diluée 2 à 3 fois par jour. Pour cela, versez 10 à 20 ml d'Octenimed dans le gobelet gradué fourni. Rincez ou gargarisez la bouche pendant au moins 30 secondes avec 10 à 20 ml d'Octenimed. Si l'on souhaite obtenir une bonne efficacité contre les levures (p. ex. contre *Candida albicans*), il est recommandé de rincer la bouche ou de gargariser pendant une minute. Crachez ensuite Octenimed. Octenimed ne doit pas être avalée. Ne pas se rincer la bouche à l'eau juste après l'utilisation. L'utilisation et la sûreté d'Octenimed n'ont pas encore été vérifiées chez les enfants de moins de 12 ans. Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien, pharmacienne ou à votre droguiste.



# octenimed<sup>®</sup> Solution pour gargarisme

## Données physico-chimiques

Couleur	pratiquement sans colore
Densité	env. 1,0 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C
pH	4 / 100 % / 20 °C
Point d'éclair	Non applicable
Routine FORM	liquide
Viscosité dynamique	non déterminé

## Remarques particulières

Les effets indésirables suivants peuvent survenir lors de l'utilisation d'Octenimed:

Des troubles gustatifs, des brûlures et une sensation d'âpreté dans la bouche et la gorge ainsi qu'un arrière-goût amer peuvent survenir. Une coloration des dents est possible. Des réactions allergiques peuvent apparaître dans de rares cas.

En cas d'absorption accidentelle de grandes quantités d'Octenimed Solution pour gargarisme/bain de bouche, une irritation de la muqueuse gastro-intestinale est possible.

Si vous remarquez des effets secondaires, vous devriez en informer votre médecin, pharmacien, pharmacienne ou droguiste. Ceci vaut en particulier pour les effets secondaires non mentionnés dans cette notice.

## Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
octenimed Gurgellösung 250 ml FL	12/Carton	70003646

## Avis d'expert et information

1 Aucune étude systématique n'a été effectuée chez les femmes enceintes. La préparation doit donc être utilisée avec prudence pendant la grossesse.

2 <http://www.swissmedicinfo.ch/>



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

**schülke Suisse**  
Schülke & Mayr AG  
Sihlfeldstr. 58  
8003 Zürich, Suisse  
Tél +41 (0) 44 - 46655 - 44  
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33  
[www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)  
[mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

**schülke siège principal**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Allemagne  
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)